



centrum
infectieziekten
friesland

Jelsumerstraat 6
Postbus 21020
8900 JA Leeuwarden
T: 058 293 94 95
F: 058 293 92 00
www.izore.nl
info@izore.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur

Buiten openingstijden bereikbaar
via 06 23 340 817
(dienstdoende arts-microbioloog)



1. SOA-triagelijst voor telefonische triage

Een patiënt belt om een SOA-onderzoek te laten uitvoeren.

Vraag 1:

U vraagt een SOA-onderzoek aan.
Heeft u klachten of is er een andere reden dat u deze vraag stelt?
Is het bijvoorbeeld zo dat u een nieuwe relatie heeft?

Vraag 2:

Wanneer was uw laatste onveilige seksueel contact?
Onveilig seksueel contact wil zeggen dat u anaal, oraal en/of vaginaal seks heeft gehad
zonder dat u een condoom heeft gebruikt.

(Toelichting: deze vraag stelt u met het oog op de windowfase* van de infecties,
zodat u een inschatting kunt maken **wanneer** u de patiënt voor een consult kunt inplannen).

U beslist nu of deze patiënt bij de assistente of bij de huisarts op consult moet komen
(het beleid hiervoor dient u voor uw eigen praktijk te bepalen).

* Windowfase:

Dit is de fase tussen de besmetting en het aantonen van het micro-organisme in het af te nemen patiëntmateriaal.
Gedurende deze windowfase is een patiënt overigens besmettelijk voor andere personen.
Voor iedere SOA geldt een andere windowfase: hieronder staat per SOA beschreven na welke termijn
na potentieel risicocontact het beste getest kan worden.

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Gonorroe | 10 dagen |
| - Chlamydia | > 3 weken |
| - HIV | 4 weken |
| - Lues (syphilis) | 6 weken |
| - Hepatitis B (HBV) | 7 weken |

2. Vragenlijst SOA-triage vóór 1e consult van patiënt aan praktijk (óf bij de assistente óf bij de huisarts)

Naam patiënt: _____

Geboortedatum: _____

Leeftijd: _____

Geslacht: _____

Nationaliteit: _____

Geboorteland: _____

1. Wat is de reden waarom u een SOA-onderzoek aanvraagt? (meerdere antwoorden mogelijk):

- ☐ Ik ben bezorgd een SOA te hebben, omdat _____
- ☐ Ik ben gewaarschuwd omdat mijn sekspartner een SOA heeft, namelijk _____
- ☐ Mijn zorgverlener denkt dat ik een SOA kan hebben, omdat _____

2a. Heeft u eerder een SOA gehad?

Zo ja, welke _____
wanneer _____

Is deze behandeld? ☐ ja ☐ nee ☐ onbekend _____

Zo ja, waarmee _____
hoe lang _____

Heeft uw sekspartner ooit een SOA gehad?

Zo ja, welke _____
wanneer _____

Is deze behandeld? ☐ ja ☐ nee ☐ onbekend _____

Zo ja, waarmee _____
hoe lang _____

3. Heeft u het afgelopen half jaar seksueel contact gehad?

- ☐ Ja, met mannen
- ☐ Ja, met vrouwen
- ☐ Ja, met zowel mannen als vrouwen
- ☐ Nee, ga verder met vraag 7

4. Hoeveel sekspartners heeft u de afgelopen 6 maanden gehad?

5a. Welke sekstechnieken heeft u met deze partners gebruikt?

- ☐ Oraal (= mond - penis/vagina contact)
Condoomgebruik: ☐ altijd ☐ meestal ☐ soms ☐ nooit
- ☐ Vaginaal (= penis - vagina contact)
Condoomgebruik: ☐ altijd ☐ meestal ☐ soms ☐ nooit
- ☐ Anaal (= penis - anus contact)
Condoomgebruik: ☐ altijd ☐ meestal ☐ soms ☐ nooit

5b. Wat was de datum van uw laatste onveilige contact? _____

6. Kan er sprake zijn van zwangerschap (alleen voor vrouwen)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Onbekend

7. Heeft u behoefte aan informatie over veilig vrijen?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

8. Zijn er nog andere zaken die wij moeten weten of heeft u nog vragen? _____

Voor de assistente/huisarts: - bij gerichte SOA-verdenking: ga door naar vragenlijst 3
- anders: voer een algemene triage uit.



3. Vervolg vragenlijst SOA-triage (in te vullen door patiënt samen met assistente/huisarts)

Naam patiënt: _____

Geboortedatum: _____

9. Wat is de reden waarom u een SOA-onderzoek aanvraagt? (meerdere antwoorden mogelijk):

Antwoord gegeven bij vraag 1:

- ☐ Ik ben bezorgd een SOA te hebben, omdat _____
- ☐ Ik ben gewaarschuwd omdat mijn sekspartner een SOA heeft, namelijk _____
- ☐ Mijn zorgverlener denkt dat ik een SOA kan hebben, omdat _____

Aanvullend:

- ☐ Ik heb klachten, namelijk (vul cijfers in van de klachten hieronder): _____
- ☐ Mijn partner heeft klachten, namelijk (vul cijfers in van de klachten hieronder): _____
- ☐ Ik kom voor een periodieke controle voor _____
- ☐ Ik erken dat ik risicogedrag laat zien, namelijk _____
- ☐ Ik merk dat mijn partner risicogedrag vertoont, namelijk _____
- ☐ Ik een nieuwe relatie heb / mijn relatie heb beëindigd.
- ☐ Mij seksueel geweld is aangedaan. (Datum/periode: _____)
- ☐ Ik ben onzeker, angstig en ongerust, omdat _____

Vrouwen/mannen

- 1 ☐ pijn of branderig gevoel bij plassen
- 2 ☐ kleine beetjes plassen
- 3 ☐ pijn bij/na vrijen
- 4 ☐ pijn/steken onderbuik (locatie?)
- 5 ☐ blaasjes rond geslachtsdelen of anus
- 6 ☐ wratjes rond geslachtsdelen of anus
- 7 ☐ zweertjes rond geslachtsdelen of anus
- 8 ☐ keelklachten
- 9 ☐ koorts
- 10 ☐ ontstoken ogen
- 11 ☐ Pijn bij de anus
- 12 ☐ ulcus

Vrouwen

- 13 ☐ jeuk, locatie: _____
- 14 ☐ veranderde afscheiding
- 15 ☐ veranderde menstruatie
- 16 ☐ contactbloedingen na of bij het vrijen
- 17 ☐ anders: _____

Mannen

- 18 ☐ afscheiding uit penis
- 19 ☐ pijn/steken bijballen
- 20 ☐ anders: _____

10. Behoort u tot een van de SOA-risicogroepen (zie onder)?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk _____

En uw sekspartner?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk _____


Risicogroepen zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM); prostituees en prostituanten (contact in de afgelopen zes maanden); personen afkomstig uit een soa-endemisch gebied (eerste en tweede generatie); personen met veel wisselende contacten (drie of meer in de afgelopen zes maanden); personen met een partner uit een van de voorgaande groepen.

12. Zijn er nog zaken die u zou willen toevoegen die niet gevraagd zijn?

Welke testen moet u aanvragen?

Op basis van de door de patiënt aangegeven klachten (zie vraag 9) en gebruikte sekstechnieken (zie vraag 5a) kunt u via onderstaande schema bepalen wat er getest moet worden. Bij dit schema gaan wij ervanuit dat uw patiënt onveilige seks heeft gehad. Bij veilige seks is een test aanvragen niet nodig. Kijkt u bij het antwoord op vraag 1 om te beoordelen of u de patiënt op consult laat komen of doorverwijst naar Sense.

Het is erg belangrijk dat u de juiste locatie (vagina, urethra, anus, rectum en/of keel) test! Een schema hiervoor kunt u vinden op de website van Izore (Vademecum / SOA-set).



Let op: bovenstaande onderzoeken dienen te worden aangevuld met specifieke diagnostische testen afhankelijk van de klachten:

Bij ulcus: denk aan Lues (syfilis);

Bij genitale blaasjes: testen op Herpes simplex (HSV);

Bij fluor: maak de afweging om de fluor te laten onderzoeken:

FLUOR

- ☐ Gisten, *Gardnerella vaginalis*, *S.aureus*, hemolytische streptokokken (vagina)

Let op: Denk aan de partnerwaarschuwingen wanneer de testuitslag positief is.

¹ Zie vraag 10.

² Bij **aanvraag SOA-testen én SOA-serologie** (syfilis, HIV en hepatitis B) graag 2 Izore aanvraagformulieren meegeven!

(Dit zijn verschillende materialen, per materiaal een formulier inzenden).